CÉPHALÉES PAR ABUS MÉDICAMENTEUX

SARADOL 28 JUIN 2019

Geneviève Demarquay

CETD - Hôpital Neurologique - Hospices Civils de Lyon

NeuroPain - Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon

Céphalée par abus médicamenteux

- « Céphalée chronique chez un patient aux ATCD de céphalée primaire et consécutive à la surconsommation régulière de traitements de crise ou de traitements symptomatiques des céphalées » ICHD3, 2018
- Premières descriptions
 - utilisation ergotamine (Peters et Horton, Proc Staff Meetings Mayo Clinic 1951)
 - utilisation phénacétine chez des ouvriers de l'industrie horlogère suisse mise à leur disposition pour soulager leurs céphalées (Moeschlin, 1957 in Diener et Limmroth 2004; Waser, Praxis 1964 in Isler 1986)
- Problématique fréquente; pathologie encore mal connue, parfois controversée

Medication Overuse Headaches

- **I. Données cliniques**
- II. Quelle conduite à tenir devant une céphalée chronique quotidienne ?
- III. Céphalée par abus ou migraine chronique avec abus ?

Céphalée par abus médicamenteux : Epidémiologie

➤ Prévalence :

- 1-2 % ; 60 millions habitants (Diener et al., 2019)
- études en population pédiatrique: Italie (3,3%), Taiwan (0,3%), Norvège (0,5%)
Canada (1,6%) (Vandenbussche et al., 2018)

➤ Terrain

- prédominance féminine (3-4:1) ; âge 30- 50 ans (Vandenbussche et al., 2018)

➤ Retentissement

- individuel sur la qualité de vie,
- sociétal :
 - coûts directs (consultations, hospitalisations, examens paracliniques, consommation médicamenteuse)
 - coûts indirects (baisse de productivité professionnelle)
 - coût annuel moyen / personne en Europe €3561 (migraine € 1222; céphalées de tension € 303) (Linde et al, The cost of headache disorders in Europe: the Eurolight project 2012).

Céphalée par abus médicamenteux : Définition

- A. céphalée survenant **≥ 15 jours/mois** chez un patient ayant une céphalée **préexistante**
- B. **surconsommation régulière** depuis **plus de 3 mois** d'un ou plusieurs médicaments utilisés comme traitement de crise et/ou traitement symptomatique des céphalées
- C. n'est **pas mieux expliquée** par un autre diagnostic de l'ICHD-3.

Surconsommation :

- Paracétamol, aspirine, AINS : **≥ 15 jours** /mois
- Tous les autres : opioïdes, ergotés, triptans, spécialités antalgiques associant plusieurs principes actifs, association de plusieurs médicaments **≥ 10 jours** / mois

→ *Définition en fonction de la fréquence d'utilisation et non en quantité utilisée*

Abus médicamenteux

Prise fréquente et régulière

Chaque ligne horizontale représente un agenda sur un mois et chaque trait vertical un jour avec consommation d'un traitement de crise

Lantéri-Minet et al., 2014

Type d'abus

- 46% d'abus en triptans (moitié pur-moitié combiné)
- 43% d'abus d'opioïdes (seuls ou combinés)
- 28% d'antalgiques

Radat et al., 2008; Créac'h et al., 2009

Présentations cliniques

- Crises céphalalgiques fréquentes sans fond douloureux

- Crises céphalalgiques fréquentes avec fond douloureux

- Fond douloureux ; atténuation des crises céphalalgiques antérieures

Abus médicamenteux : différents aspects

- Distinction en fonction de la présentation clinique de la céphalée
- Distinction en fonction du type de céphalée primaire : migraine ou céphalée de tension
- Distinction en fonction du type de médicaments: opioïdes (sevrage souvent difficile) vs. AINS/triptans
- Distinction en fonction des co-morbidités psychiatriques, autres pathologies douloureuses, dépendance autres abus (anxiolytiques, hypnotiques), ATCD familiaux ?
 - ➔ Population hétérogène +++
 - ➔ Ne pas tenir compte « uniquement » de l'agenda

Identifier le type de céphalée avec abus médicamenteux

CAM type I

- co-morbidité psychiatrique minime
- abus par médicaments non-psychoactifs : AINS triptans
- absence de dépendance à d'autres substances

CAM type II

- co-morbidité psychiatrique
- abus par médicaments psychoactifs
- phénomène de dépendance
- autres abus

Facteurs de risque

	Odds ratio (95% CI)	Comment
Metabolic syndrome ¹⁴	5.3 (1.6–24.6)	Obesity is the most important risk factor.
Regular intake of tranquilizers ¹⁵	5.2 (3.0–9.0)	Avoid or withdraw tranquilizers
Anxiety disorder or depression ¹⁵	4.7 (2.4–9.0)	Screening is advised
Physical inactivity ¹⁵	2.7 (1.2–6.3)	Recommend exercise
Intake of opioids more than 10 days per month ^{16,17}	2.3 (1.3–3.9)	Might lead to addiction
Female sex ¹⁶	1.9 (1.4–2.6)	..
Low educational level	1.9 (1.2–3.0)	..
Chronic musculoskeletal disease ¹⁵	1.9 (1.4–2.7)	..
Smoking ^{15,16}	1.8 (1.2–2.5)	Smoking cessation education is advised
Age (<50 years) ¹⁶	1.8 (1.3–2.4)	..
Gastrointestinal disease ¹⁵	1.6 (1.1–2.2)	..
Intensity of headache ¹⁸	1.5 (1.0–2.1)	..
Intake of aspirin more than 15 days per month ¹⁷	0.5 (0.3–0.9)	Protective effect
Intake of ibuprofen more than 15 days per month ¹⁶	0.7 (0.5–1.0)	Protective effect

Data from Denmark,¹⁸ Norway,¹⁵ USA,^{16,17} and China.¹⁴ Adapted from Diener and colleagues (2018).¹⁸

Table 1: Risk factors associated with medication overuse headache that might help to identify people at risk

Comportement/dépendance

- médicament
- susceptibilité génétique ?

Sensibilisation centrale

- physiopathologie de la migraine;
- aggravation de la fréquence des crises
- médicaments

Facteurs génétiques

- ATCD familiaux CAM, dépendance
- études génétiques sur polymorphisme : transmission sérotoninergique, dopaminergique, dépendance, voie CGRP

Medication Overuse Headaches

- I. Données cliniques
- **II. Quelle conduite à tenir devant une céphalée chronique quotidienne ?**
- III. Céphalée par abus ou migraine chronique avec abus ?

Disponible en ligne sur

ScienceDirect

www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte

www.em-consulte.com

Recommandations

Démarche diagnostique générale devant une céphalée chronique quotidienne (CCQ) – Prise en charge d’une CCQ chez le migraineux : céphalée par abus médicamenteux et migraine chronique/Recommandations de la SFEMC, ANLLF et SFETD

Management of chronic daily headache in migraine patients: Medication overuse headache and chronic migraine. French guidelines (French Headache Society, French Private Neurologists Association, French Pain Society)

M. Lantéri-Minet^{a,b}, G. Demarquay^c, H. Alchaar^d, J. Bonnin^e, P. Cornet^f, X. Douay^g, V. Dousset^h, G. Géraudⁱ, V. Guillouf^j, M. Navez^k, F. Radat^l, S. Radenne^m, A. Revolⁿ, D. Valade^o, A. Donnet^{b,o,*}

Démarche diagnostique face à une CCQ

Diagnostic de CCQ

= **Céphalées ≥ 15 j / mois, depuis plus de 3 mois (agenda)**

Démarche diagnostique face à une CCQ

Diagnostic de CCQ

Eliminer une CCQ secondaire

= Céphalées $\geq$ 15 j / mois, depuis plus de 3 mois (agenda)

CCQ : « drapeaux rouges »

Terrain et ATCD médicaux

- Apparition de la CCQ chez un sujet de + de 50 ans
- Apparition de la CCQ dans un contexte pathologique (néoplasie, maladie systémique..)
- Absence de céphalée primaire préalable à l'apparition de la CCQ

Caractéristiques de la céphalée

- Début récent de la CCQ (< 1 an)
- Déclenchement de la céphalée par la toux, effort physique, manœuvre de Vasalva
- Caractère postural
- Association à des symptômes neurologiques (autres qu'une aura)

Données de l'examen clinique

- Anomalie(s) à l'examen clinique, œdème papillaire au FO

Démarche diagnostique face à une CCQ

Diagnostic de CCQ

= Céphalées ≥ 15 j / mois, depuis plus de 3 mois (agenda)

Éliminer une CCQ secondaire

Examens complémentaires si « drapeaux rouges »

Algorithme diagnostique face à une CCQ

Diagnostic de CCQ

= Céphalées ≥ 15 j / mois,
depuis plus de 3 mois

Recherche de « drapeaux rouges »

Elimination d'une CCQ
secondaire lésionnelle

Déterminer la nature de la céphalée initiale

Migraine ou céphalée de
tension épisodique sous-
jacente?

Algorithme diagnostique face à une CCQ

Diagnostic de CCQ

= Céphalées ≥ 15 j / mois,
depuis plus de 3 mois

Recherche de « drapeaux rouges »

→ Elimination d'une CCQ
secondaire lésionnelle
Examens complémentaires

Déterminer la nature de la céphalée initiale

→ Migraine ou céphalée de
tension épisodique sous-
jacente?

Analyse de la consommation médicamenteuse

Analyse de la consommation médicamenteuse

- Depuis Combien De Temps ?
- Quel(s) Médicament(s) ? Combien ?
- Pourquoi ? Motifs de la prise médicamenteuse ?
 - épisodes céphalalgiques fréquents et ttt efficace ?
 - intrication des céphalées avec d'autres phénomènes douloureux ex : pathologie musculo-squelettique
 - prise anticipatoire des médicaments par ex. liée à l'anxiété ?
 - phénomènes de dépendance ?
- Quel est le motif de consultation ?
 - Demande du patient ? Baisse d'efficacité des ttt de crise? Addiction? Peur des effets secondaires (ex triptans)
 - Demande du patient ? Du pharmacien?

Algorithme diagnostique face à une CCQ

Diagnostic de CCQ

= Céphalées ≥ 15 j / mois,
depuis plus de 3 mois

Recherche de « drapeaux rouges »

→ Elimination d'une CCQ
secondaire lésionnelle
Examens complémentaires

Déterminer la nature de la céphalée initiale

→ Migraine ou céphalée de
tension épisodique sous-
jacente?

Analyse de la consommation médicamenteuse

→ Abus médicamenteux ?

Recherche de co-morbidités et facteurs de risque

Synthèse diagnostique : CCQ chez un migraineux

Patient aux ATCD de migraine actuellement en CCQ sans abus médicamenteuxmigraine chronique?

Patient migraineux en CCQ se présentant avec un abus médicamenteux

- ❖ CCQ par abus médicamenteux? (abus = cause des CCQ)
- ❖ migraine chronique? (abus = conséquence des crises céphalalgiques)

SEVRAGE : préalable incontournable à la prise en charge d'un patient migraineux en CCQ se présentant en abus médicamenteux (*accord professionnel*) *Recommandations 2014*

Quel type de sevrage médicamenteux ?

Aucune donnée factuelle ne permet de recommander un protocole de sevrage particulier

- ❖ aucune étude n'a comparé sevrage brutal et sevrage progressif
- ❖ aucune étude n'a évalué spécifiquement un traitement prophylactique lors du sevrage
- ❖ efficacité similaire entre sevrage ambulatoire et sevrage hospitalier (Grazzi et al., 2008, Creach' et al., 2011)
- ❖ efficacité similaire entre approche pharmacologique et non pharmacologique (Rossi et al., 2006)

En pratique, le sevrage est le + souvent réalisé en ambulatoire

- ❖ peut être brutal ou progressif
- ❖ modalités adaptées individuellement en fonction du patient, de son mode de vie, du ou des traitement (s) utilisé(s) en excès

Quel type de sevrage médicamenteux ?

Sevrage hospitalier : modalité + rare

- ✧ impossibilité pour le patient à effectuer le sevrage en ambulatoire
- ✧ ancienneté de l'abus
- ✧ abus impliquant plusieurs classes pharmacologiques
- ✧ dépendance comportementale et/ou une comorbidité psychiatrique
- ✧ Sevrage brutal

Sevrage et traitement prophylactique

« Il est recommandé d'associer au sevrage un traitement prophylactique antimigraineux »

Tout traitement de fond antimigraineux validé dans la migraine épisodique peut être proposé (*accord professionnel*)

Le choix du traitement prophylactique repose sur les comorbidités, les traitements antérieurement utilisés et les effets indésirables potentiels

Démarche éducative / ttt non-médicamenteux

➤ Démarche éducative

- tenue d'un agenda
- connaissance du seuil de médicaments à ne pas dépasser/mois ; noter sur ordonnance
- identifier les prises médicamenteuses anticipatoires
- distinguer migraine/céphalées de tension/autres céphalées
- sensibilisation au risque des autres substances psycho-actives

➤ Prise en charge psycho-comportementale : relaxation gestion de stress TCC,

➤ Prise en charge des co-morbidités

Synthèse à l'issue du sevrage

☞ si la CCQ a **disparu** 2 mois après le sevrage et que la **migraine** est revenue **épisodique** : **le diagnostic de céphalée par abus médicamenteux est confirmé**

l'étape ultérieure est le suivi du patient en vue de prévenir la rechute :
agenda prospectif ; ne pas utiliser de traitement de crise plus de 2 jours par semaine de façon régulière (accord professionnel)

☞ si la CCQ **persiste** deux mois après la réalisation d'un **sevrage bien conduit**, le diagnostic de **migraine chronique** est posé sous réserve que la céphalée réponde aux **critères** diagnostiques de migraine chronique.

Si le sevrage n'est pas effectif (impossibilité complète du sevrage ou réapparition de l'abus médicamenteux avant les deux mois requis); il est recommandé de refaire un sevrage avec d'autres modalités.

Algorithme diagnostique face à une CCQ

Diagnostic de CCQ

= Céphalées ≥ 15 j / mois,
depuis plus de 3 mois

Recherche de « drapeaux rouges »

Elimination d'une CCQ
secondaire lésionnelle
Examens complémentaires

Déterminer la nature de la céphalée initiale

Migraine ou céphalée de
tension épisodique sous-
jacente?

Analyse de la consommation médicamenteuse :
SEVRAGE

**CCQ PAR ABUS
MÉDICAMENTEUX**

MIGRAINE CHRONIQUE

Medication Overuse Headaches

- I. Définition, présentation clinique
- II. Quelle conduite à tenir devant une céphalée chronique quotidienne ?
- III. **Céphalées par abus ou migraine chronique avec abus ?**

Migraine chronique : définition

Céphalée survenant au moins **15 jours par mois** depuis plus de **3 mois**, ayant les caractéristiques d'une **céphalée migraineuse au moins 8 jours par mois**.

Critères diagnostiques

- **A. Céphalée** (migraineuse ou tensive) au **moins 15 jours/mois** depuis **plus de 3 mois**, et répondant aux critères B et C
- **B.** Survenant chez un patient ayant eu au moins cinq crises répondant aux critères B-D de la migraine sans aura et/ou aux critères B et C de la migraine avec aura
- **C.** Au moins **8 jours/mois** depuis plus de 3 mois, la céphalée répond à l'un des éléments suivants:
 - 1. critères C et D de la **Migraine sans aura**
 - 2. critères B et C de la **Migraine avec aura**
 - 3. considérée **à son début** par le patient comme étant une **migraine** et soulagée par un triptan ou un dérivé ergoté
- **D.** N'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic de l'ICHD-3

→ **Crises de différentes intensités**

Migraine chronique

Epidémiologie

- prédominance féminine (3:1)
- âges: 18-29 ans; 40-49 ans

May et Schulte, 2016

Schwedt BMJ 2014

- **8% des patients migraineux** (May et Schulte, 2016)

Facteurs de risque

Revue de la littérature (Buse et al., 2018) : 1879 articles; 19 éligibles dont 17 correspondants aux critères : 13 études longitudinales; 4 études cas-témoins

- **Fréquence des crises élevées**
- **Dépression**
- **Abus médicamenteux**

Migraine chronique : traitement

- Démarche éducative
- Prise en charge non médicamenteuse
- Prise en charge des facteurs de risques « modifiables »
- Traitement prophylactique médicamenteux

Les études contrôlées dédiées spécifiquement à la migraine chronique ont concerné :

- ✧ topiramate
- ✧ toxine botulinique de type A, refus AMM, refus RTU
- ✧ stimulation du nerf grand occipital ; perte marquage CE
- ✧ anti-CGRP

➔ en pratique, tout traitement proposé dans la migraine épisodique

Migraine avec abus médicamenteux : est-ce que les traitements prophylactiques sont efficaces?

Analyse de l'efficacité érenumab migraine chronique avec et sans abus médicamenteux

- Analyse de sous-groupes : 667 migraineux chroniques traités par placebo érenumab 70 vs érenumab 140
- 41% (n=274) patients avec critères d'abus médicamenteux

Conclusion

- Frontières entre céphalées par abus médicamenteux et migraine chronique : étroites
- Tout abus médicamenteux n'est pas la cause de la céphalée chronique

Conclusion

- Frontières entre céphalées par abus médicamenteux et migraine chronique : étroites
- Tout abus médicamenteux n'est pas la cause de la céphalée chronique;
- L'abus médicamenteux doit être considéré chez chaque patient car il s'agit au minimum facteur de risque de CCQ.
- Ne pas considérer uniquement l'agenda mais le type de médicament, co-morbidités, la présentation clinique
- Ne pas surestimer, ne pas sous estimer l'abus médicamenteux