

Bonjour!

Vous avez **20** questions. Bonne chance!
1 point par bonne réponse
0 point par mauvaise réponse ou sans réponse

Question 1/20

Quel est le délai à respecter entre l'injection de MORPHINE IV et la réalisation d'un soin douloureux ?



- ☐ Immédiatement
- ☒ 7 à 10 min
- ☐ > à 30 min

Question 2/20

Recommandation de la dose maximale par 24h du PARACETAMOL chez la personne de plus de 75 ans



- ☐ 4g/ 24h
- ☒ 3g/24h

Question 3/20

Pour faire le passage de FENTANYL transdermique à la MORPHINE injectable (IV ou S/C)



- ☐ Débuter la morphine injectable 12h avant le retrait du patch de fentanyl
- ☒ Débuter la morphine injectable 12h après le retrait du patch de fentanyl
- ☐ Débuter la morphine injectable 72h après le retrait du patch de fentanyl
- ☐ Débuter la morphine injectable 72h avant le retrait du patch de fentanyl

Question 4/20

Passage de la MORPHINE LP à la MORPHINE injectable (IV ou SC)



- ☐ Débuter la Morphine injectable 10h avant la dernière prise de morphine LP
- ☒ Débuter la Morphine injectable 10h après la dernière prise de morphine LP
- ☐ Débuter la Morphine injectable 12h avant la dernière prise de morphine LP
- ☐ Débuter la Morphine injectable 12h après la dernière prise de morphine LP

Question 5/20

Passage de la MORPHINE orale LP au patch de FENTANYL



- ☒ Poser le patch en même temps que la dernière prise de morphine orale LP
- ☐ Poser le patch 72h après la dernière prise de morphine orale LP
- ☐ Poser le patch 72h avant la dernière prise de morphine orale LP

Question 6/20

L'efficacité antalgique du MEOPA se manifeste pleinement :



- ☐ Après 1 minute d'inhalation
- ☒ Après au moins 3 minutes d'inhalation
- ☐ Après plus de 15 minutes d'inhalation

Question 7/20

L'inhalation du MEOPA ne doit pas dépasser par jour :



- ☐ 20 minutes en continu
- ☒ 60 minutes en continu
- ☐ 120 minutes en continu

Question 8/20

Quel est le délai à respecter entre l'injection de MORPHINE S/C et la réalisation d'un soin douloureux ?



- ☐ 5 minutes
- ☒ 20 minutes
- ☐ 60 minutes

Question 9/20

Quel est le délai à respecter entre la prise de MORPHINE PO et la réalisation d'un soin douloureux ?



- ☐ 15 minutes
- ☒ 40 minutes
- ☐ 60 minutes

Question 10/20

Parmi ces traitements , quels sont ceux qui nécessitent une ordonnance sécurisée ?



- ☒ TRAMADOL
- ☒ MORPHINE
- ☐ PARACETAMOL
- ☒ PREGABALINE
- ☒ CODEINE

Question 11/20

Selon les recommandations françaises, parmi ces traitements , quels sont ceux qui ont une action antalgique pour les douleurs neuropathiques ?



- ☐ Morphine
- ☒ Venlafaxine
- ☒ Gabapentine
- ☒ Duloxétine
- ☐ Fentanyl

Question 12/20

Quel est l'antidote spécifique en cas de surdosage en MORPHINE ?



- ☒ Naloxone
- ☐ Flumazénil
- ☐ Vitamine K

Question 13/20

Quel est l'effet secondaire le plus fréquent des morphiniques, nécessitant souvent un traitement préventif ?



- ☒ Constipation
- ☐ Hypotension
- ☐ Hyperthermie
- ☐ Détresse respiratoire

Question 14/20

Quel est le principal risque lié à l'arrêt brutal d'un traitement par opioïdes après plusieurs semaines d'utilisation ?



- ☐ Hyperglycémie
- ☐ Hypertension artérielle
- ☒ Syndrome de sevrage

Question 15/20

Parmi les propositions suivantes, quelle est la conduite à tenir en cas de nausées induites par

les morphiniques ?



- ☐ Arrêter immédiatement le traitement
- ☒ Proposer un antiémétique
- ☐ Augmenter la dose de morphine

Question 16/20

Quelle est la composition de l'IXPRIM ® ?



- ☐ Tramadol 50 mg + Ibuprofène 200 mg
- ☒ Tramadol 37,5 mg + Paracétamol 325 mg
- ☐ Tramadol 100 mg + Codéine 30 mg

Question 17/20

Quelle précaution est essentielle lors de l'administration de TRAMADOL chez un patient épileptique ?



- ☐ Augmenter la dose progressivement
- ☒ Surveiller l'apparition de convulsions et adapter la posologie
- ☐ Associer systématiquement un antiépileptique

Question 18/20

Quelle est la durée d'action du TRAMADOL à libération immédiate ?



- ☐ 2 à 4 heures
- ☒ 4 à 6 heures
- ☐ 8 à 12 heures

Question 19/20

Pourquoi faut-il éviter l'association IZALGI ® + autres médicaments contenant du PARACETAMOL ?



- ☒ Risque de toxicité hépatique par surdosage en paracétamol
- ☐ Risque de potentialisation des effets opioïdes
- ☐ Risque d'allergie croisée

Question 20/20

Un patient traité par TRAMADOL + antidépresseur tricyclique présente une confusion. Quelle est votre première hypothèse ?



- ☐ suspicion d'AVC
- ☒ Interaction médicamenteuse majorant les effets sédatifs et anticholinergiques
- ☐ Hypoglycémie